







گزارش وضع هوا در چهار روز گذشته

تاریخ	وضعیت هوا	حداکثر سرعت وزش باد		دمای هوا (سانتیگراد)		رطوبت نسبی (%)						بارندگی	تخیر	ساعات آفتابی	
		سمت	(m/s)	کمینه	بیشینه	بیشینه	کمینه	5cm	10cm	20cm	30cm				50cm
چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷	صاف تا کمی ابری همراه گردوغبار	290	5	47.0	31.8	15	4	0.0	20.0	9.8	9.8	27.4	20.0	9.8	9.8
پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷	صاف تا کمی ابری همراه گردوغبار	260	5	48.0	32.8	16	9	0.0	21.3	9.8	9.8	27.6	21.3	9.8	9.8
جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷	صاف همراه گردوغبار	350	8	46.4	33.8	18	1	0.0	21.2	10.7	10.7	27.4	21.2	10.7	10.7
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷	صاف تا کمی ابری همراه گردوغبار	50	10	46.4	28.0	12	3	0.0	23.6	12.3	12.3	25	23.6	12.3	12.3

تاریخ	پیش بینی وضعیت هوا	حداکثر سرعت وزش باد		دمای هوا (سانتیگراد)		رطوبت نسبی (%)		بارندگی	تخیر	ساعات آفتابی
		سمت	سرعت (m/s)	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه			
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷	صاف و گاهی وزش باد شدید از اواخر وقت گردوغبار	350	10	30.0	45.0	5	20	0.0	20.0	9.8
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷	صاف و گاهی وزش باد شدید از اواخر وقت گردوغبار	360	10	29.0	45.0	5	20	0.0	20.0	9.8
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷	صاف و گاهی وزش باد شدید از اواخر وقت گردوغبار	40	10	29.0	44.0	5	20	0.0	20.0	9.8
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷	صاف و گاهی وزش باد شدید	320	8	30.0	45.0	5	20	0.0	20.0	9.8

ملاحظات



توصیه های هواشناسی کشاورزی در روزهای آینده:

آمار منظور شده در نمودارها مربوط به هفته ۳۷ سال زراعی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ لغایت ۱۳۹۷/۳/۱۸ می باشد

- مبارزه با کنه تارتن در درختان انجیر که با افزایش دمای هوا جمعیت کنه نیز افزایش می یابد به جهت سم پاشی از سموم کنه کش کنفیدور-ایتیون و آبامکتین می توان استفاده کرد. سم پاشی در ساعات غروب آفتاب یا صبح و در روزهای آرام و بدون وزش باد انجام شود. ۲- مبارزه با بیماری سفیدک در مزارع صیفی جات با سموم قارچ کش مناسب مانند زینب-مالاتیون ۳- مبارزه با سفیدک سطحی در درختان انگور به دلیل تولید میوه امکان پذیر نمی باشد و موثر نمی باشد جهت مبارزه با سفیدک باید اقدامات پیشگیرانه توسط باغداران عزیز انجام شود. ۴- آبیاری باغات بدلیل گرمای زیاد در ساعات شبانه صورت گیرد. کاهش فعالیت های کشاورزان در ساعات گرم روز در صورت امکان از سیستم های خنک کننده ابتدایی (کولر آبی یا فن) استفاده شود.
- با توجه به پیش بینی های صورت گرفته که در اواسط هفته دمای هوا به بالای ۴۸ درجه سانتیگراد می رسد توصیه های زیر به دامداران-زنبورداران و سایر جامعه هدف دامپزشکی ارائه می شود.
  - جوجه ریزی سالن های پرورش برابر ظرفیت جهت جلوگیری از استرس گرمایی. ۲- ایجاد سایه بان برای کندوهای زنبورعسل و انتقال کندوها به جای خنک
  - ایجاد سایه بان در استخرها پرورش ماهی قزل آلا در منطقه سراب میمه در روزهای گرم و آفتابی به منظور جلوگیری از آفتاب سوختگی در مزارع پرورش ماهی
  - خودداری از چرای دام ها خصوصاً بره ها و بزغاله ها در ساعات گرم روز
  - مبارزه مستمر با مگس و حشرات ناقل بیماری
  - به جریان انداختن هوا با استفاده از فن در داخل اصطبل ها

- تجهیز و تدوین بولتن: حاجت اله فتحی
- کارشناسان کشاورزی: محمداصداق آزادی
- مریم سلیمی
- مریم نوری
- کارشناس دامپزشکی: روح اله کریمی
- کارشناسان هواشناسی: بهروز همتی
- حاجت اله فتحی
- مختار محمدی
- محمد پاریاب

37	هفته
0.8	مجموع بارندگی هفته گذشته
0	بارندگی هفتگی مدت مشابه سال قبل
0	بارندگی هفتگی مدت مشابه بلند مدت
215.1	بارندگی سال زراعی جاری تا کنون
213.4	بارندگی مدت مشابه سال قبل
264.3	بارندگی مدت مشابه بلند مدت
38.1	میانگین دمای هفته قبل درسالجاری
36	هفته مشابه سال گذشته
35.8	هفته مشابه بلند مدت
3982.3	جمع واحدهای حرارتی بالاتر از صفر
3207.3	جمع واحدهای حرارتی بالاتر از 5
2190.5	جمع واحدهای حرارتی بالاتر از 10
1330.8	جمع واحدهای حرارتی بالاتر از 15
1397/3/12	شروع
1397/3/18	پایان