

## بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۳/۰۸/۲۷

صفحه ۱ از ۳

### وضعیت جوی ایلام در چهار روز گذشته

| تاریخ      | وضعیت آسمان |      | باد (متر بر ثانیه) |        | دما (درجه سلسیوس) |        | بارش      | تبخیر | ساعات آفتابی | رطوبت (%) |       | میانگین دمای اعماق خاک (درجه سلسیوس) |       |      |   |  | سایر پدیده های مهم جوی |
|------------|-------------|------|--------------------|--------|-------------------|--------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|--------------------------------------|-------|------|---|--|------------------------|
|            | سمت         | سرعت | کمینه              | بیشینه | کمینه             | بیشینه | (میلیمتر) | کمینه | بیشینه       | ۱۰۰ cm    | ۵۰ cm | ۲۰ cm                                | ۱۰ cm | ۵ cm |   |  |                        |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲۶۰         | ۶    | ۵.۳                | ۱۹.۷   | ۰                 | ۳.۱    | ۹.۳       | ۹۳    | ۲۹           | ۱۳.۹      | ۱۳.۸  | ۱۵                                   | ۱۷.۹  | ۲۰.۳ | ۳ |  |                        |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲۷۰         | ۶    | ۶.۵                | ۱۹.۱   | ۰                 | ۳.۳    | ۸.۵       | ۹۴    | ۲۶           | ۱۴.۹      | ۱۵.۵  | ۱۶.۱                                 | ۱۷.۷  | ۲۰.۴ | ۳ |  |                        |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲۴۰         | ۶    | ۵.۵                | ۱۸.۸   | ۰                 | ۲.۲    | ۹.۲       | ۹۱    | ۲۷           | ۱۳.۶      | ۱۳.۹  | ۱۴.۷                                 | ۱۷.۶  | ۲۰   | ۲ |  |                        |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۰۰         | ۳    | ۴.۱                | ۱۸.۳   | ۰                 | ۳      | ۸.۱       | ۸۹    | ۲۷           | ۱۳.۱      | ۱۳.۷  | ۱۴.۷                                 | ۱۷.۲  | ۲۰   | ۲ |  |                        |

### پیش بینی وضعیت جوی چهار روز آینده ایلام

| تاریخ      | وضعیت جوی |     | باد (متر بر ثانیه) |       | دما (درجه سلسیوس) |       | نم نسبی |  | سایر پدیده های مهم جوی  |
|------------|-----------|-----|--------------------|-------|-------------------|-------|---------|--|---|
|            | سرعت      | سمت | بیشینه             | کمینه | بیشینه            | کمینه |         |  |   |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |           |     | ۱۹                 | ۷     |                   |       |         |  | صاف تا نیمه ابری گاهی وزش باد   |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |           |     | ۱۹                 | ۹     |                   |       |         |  | قسمتی ابری تا ابری گاهی افزایش باد در بعضی ساعتها رگبار و رعد و برق     |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |           |     | ۱۸                 | ۶     |                   |       |         |  | نیمه ابری تا ابری گاهی افزایش باد در بعضی ساعتها بارش باران و رعد و برق |
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |           |     | ۱۷                 | ۴     |                   |       |         |  | صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد و احتمال بارش خفیف باران در پاره ای نقاط |

| رشته     | نوع محصول | مرحله رشد | توصیه  |
|----------|-----------|-----------|--|
| زراعت    |           |           | تسریع در برداشت چغندر و سایر محصولات باقی مانده در سطح مزارع<br>تسریع در عملیات کشت محصولات پاییزه (گندم، جو و علوفه دیم) با تاکید بر استفاده از بذور با جاری شده و ضد عفونی شده<br>انتقال بذور و کودهای شیمیایی به مکان های مسقف<br>اقدام به مصرف کودهای پتاسه در مزارع کلزا<br>لایروبی و پاکسازی کانال ها و مسیرهای ورودی آب مزارع |
| دامپروری |           |           | جلوگیری از چرای دام در ارتفاعات<br>مراقبت از تاسیسات گاوداری ها و دامداری ها برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد های شدید   |

## بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۳/۰۸/۲۷

صفحه ۲ از ۳

|  |  |  |                                 |
|--|--|--|---------------------------------|
| <p>استفاده از قییم جهت استقرار نهال های یک ساله با توجه به وزش شدید باد<br/>بازسازی تشتک ها جهت ذخیره آب<br/>با توجه به بارندگی های پیش بینی شده باغدارانی که از کودهای ریزمغذی به صورت محلول پاشی ( باغات زیتون و مرکبات)<br/>استفاده می کنند ۴۸ ساعت قبل یا بعد از بارندگی صورت گیرد<br/>جمع آوری میوه ها و برگ های خزان شده کف باغ و خارج کردن آنها از جهت جلوگیری از تجمع آفات و بیماری ها</p>   |  |  | <p>باغداری</p>                  |
| <p>عدم چرای زودرس مراتع قشلاقی<br/>تامین نهاده های لازم ( بذر و نهال) جهت اجرای عملیات های اصلاح و احیا مراتع<br/>تمهیدات لازم جهت اجرای عملیات های بیولوژیک در بخش های مختلف جنگل، مرتع و آبخیز<br/>لایروبی و پاکسازی پشت سازه های سنگی- ملاتی در بالادست حوزه های آبخیز شهری و روستایی<br/>برچیدن کارگاه های آبخیزداری و پاکسازی بستر و مسیر رودخانه ها</p>  |  |  | <p>مرتع و<br/>آبخیزداری</p>     |
| <p>احتیاط در کوچ کردن به مناطق قشلاقی<br/>عدم استقرار در ارتفاعات و مناطق بادگیر<br/>با توجه به پیش بینی هواشناسی نسبت به محکم کردن سیاه چادرها و سرپناه های عشایری اقدام گردد<br/>رعایت پوشش مناسب برای خوارک دام با توجه به پیش بینی های هواشناسی</p>  |  |  | <p>عشایر</p>                    |
| <p>تغذیه دستی در زنبورستان ها<br/>تنظیم سوراخ پرواز کندوها<br/>وزنه گذاری کندوها<br/>عدم استقرار زنبورستان ها در مناطق پست و مسیل ها</p>   |  |  | <p>زنبورداری</p>                |
| <p>استحکام سازه ها و پوشش گلخانه ها با توجه به وزش شدید باد و همچنین تامین سوخت با توجه به فصل سرما در محل<br/>گلخانه ها</p>   |  |  | <p>گلخانه</p>                   |
| <p>قرار دادن ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی در هانگارها به منظور محافظت در مقابل باد، باران و رگبارهای احتمالی<br/>تسریع در احداث زهکش های مناسب در داخل و اطراف مزارع با استفاده از ادوات و تجهیزات خاص<br/>اجرای عملیات کاشت مستقیم در بقایا در صورت مهیا شدن شرایط جوی و عدم ورود دستگاه در زمان خیس بودن خاک<br/>تنظیم کارنده ها و تسریع در کاشت غلات قبل از شروع بارش ها<br/>استفاده از ضد یخ در ماشین های کشاورزی و موتورهای چاه آب</p> |  |  | <p>ماشین آلات و<br/>تاسیسات</p> |

## بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۳/۰۸/۲۷

صفحه ۳ از ۳

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
|  | <p>سم پاشی در مزارع کلزا علیه علف های هرز ( مخصوصا گل جالیز) در ساعات مناسب جمع آوری و انهدام میوه های آلوده جهت کاهش کرم گلوگاه انار ضد عفونی با گاجو و کروزه در مناطق جنوبی بر علیه آفات در شرایط جوی مناسب قبل کاشت گندم ضد عفونی بذور خودمصرفی گندم و جو در شرایط جوی مناسب قبل از کشت برای کنترل برخی آفات شخم سطحی با پاییل کردن سایه انداز درختان مبارزه مکانیکی با آفاتی نظیر سپردار (شامل پاک کردن تنه و شاخه های قطور آلوده با اسفنج یا اسکاج نرم) مبارزه شیمیایی با درختان سیاه ریشه با استفاده از ترکیبات مسی قرار دادن گونی یا کارتن دور تنه و شاخه های اصلی درختان آلوده به لاروهای زمستان گذران کرم سیب محلول پاشی و سم پاشی با احتیاط صورت گیرد توجه به اطلاعات هواشناسی و اطمینان از عدم بارندگی ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از سم پاشی مورد تایید است</p> |  | <p>حفظ نباتات</p> |
|  | <p>مراقبت های ویژه از تاسیسات مرغداری ها<br/>تامین و تهیه سوخت جایگزین<br/>مراقبت از سیستم های گرمایشی و تهویه ها</p>  |  | <p>مرغداری</p>    |