

بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۴/۰۲/۰۷

صفحه ۱ از ۳

وضعیت جوی ایلام در چهار روز گذشته

تاریخ	وضعیت آسمان		باد (متر بر ثانیه)		دما (درجه سلسیوس)		بارش	تبخیر	ساعات	رطوبت (%)		میانگین دمای اعماق خاک (درجه سلسیوس)					سایر پدیده های مهم جوی
	سمت	سرعت	سمت	سرعت	کمینه	بیشینه	(میلیمتر)	آفتابی	کمینه	بیشینه	۱۰۰ cm	۵۰ cm	۲۰ cm	۱۰ cm	۵ cm		
۱۴۰۴/۰۲/۰۳		۱۰	۱۴۰	۱۰	۱۳.۴	۲۸.۴	۰	۶	۱۱.۳	۵۷	۱۹	۲۱	۱۹.۹	۱۸.۹	۱۷.۹	۱۵.۹	۱۳
۱۴۰۴/۰۲/۰۴		۹	۲۶۰	۹	۱۳.۷	۲۹.۶	۰	۷.۴	۹.۶	۴۹	۱۷	۲۲.۳	۲۰.۶	۱۹.۵	۱۸.۸	۱۶	۱۱
۱۴۰۴/۰۲/۰۵		۱۵	۳۱۰	۱۵	۱۴.۹	۲۹.۷	۰	۷.۵	۰.۵	۴۵	۱۶	۲۰.۲	۱۹.۵	۱۹.۴	۱۸.۷	۱۶.۱	۱۰
۱۴۰۴/۰۲/۰۶		۵	۱۴۰	۵	۱۵.۳	۲۳.۴	۰.۴	۳.۹	۰.۳	۷۲	۱۴	۱۹.۶	۱۹.۲	۱۹	۱۹.۱	۱۶.۴	۱۴

پیش بینی وضعیت جوی چهار روز آینده ایلام

تاریخ	وضعیت جوی		باد (متر بر ثانیه)		دما (درجه سلسیوس)		نم نسبی		سایر پدیده های مهم جوی
	سمت	سرعت	سمت	سرعت	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	
۱۴۰۴/۰۲/۰۷		۸-۱۰ m/s	۲۰۰-۲۲۰		۲۷	۱۵	۸۰	۲۰	۱۴
۱۴۰۴/۰۲/۰۸		۶-۸ m/s	۲۰۰-۲۳۰		۲۴	۱۵	۷۰	۲۰	۱۳
۱۴۰۴/۰۲/۰۹		۸-۱۰ m/s	۲۱۰-۲۳۰		۲۵	۱۲	۸۰	۲۰	۱۲
۱۴۰۴/۰۲/۱۰		۴-۸ m/s	۲۲۰-۲۴۰		۲۷	۱۳	۸۰	۲۰	۱۳

بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۴/۰۲/۰۷

صفحه ۲ از ۳

رشته	نوع محصول	مرحله رشد	توصیه
زراعت			<p>۱. مصرف کودهای پتاس بالا جهت افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها و افزایش استحکام در برابر ورس</p> <p>۲. آبیاری مرتب و به موقع مزارع به خصوص مزارع سیب زمینی با توجه به نیاز آبی بوته سیب زمینی</p> <p>۳. بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها و آفات</p> <p>۴. برداشت دانه کلزا در ساعات گرم و وسط روز جهت کاهش ریزش دانه</p> <p>مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع مراقبت در هوادهی کشت های زیر پلاستیک</p>
دامپروری			عدم چرا و صعود به ارتفاعات بعلت احتمال وجود رعد و برق
شیلات			<p>در زمان گردوخاک تعویض آب استخرها - شستشوی استخرها</p> <p>در زمان وزش باد ایمن سازی تاسیسات برقی وسازه های پوششی</p> <p>در زمان بارندگی های شدید فصلی نصب توربهای مناسب در ورودی های استخرها و نیز نصب سیل بند موقت در ورودی کانال اصلی</p>
باغداری			<p>۱ تنظیم دمای گلخانه مراکز کشت قارچ</p> <p>۲ خودداری از محلول پاشی در مصرف کودهای شیمیایی در مناطق سردسیر</p> <p>۳ بیل کاری پای درختان میوه و کنترل مکانیکی علفهای هرز</p> <p>۴ جمع آوری و از بین بردن شاخه های آلوده درون باغ</p>
عشاير			دامداران مراقب خطر رعد و برق در ارتفاعات باشند
زنبورداری			زنبورداران هماهنگ با مزرعه داران دریچه های کندوی خود را تنظیم و مدیریت کنند.
گلخانه			.
ماشین آلات و تاسیسات			<p>- رفع نقص و تنظیم کمباین های برداشت کلزا خصوصا در مناطق جنوبی</p> <p>- انجام عملیات برداشت در شرایط رطوبتی مناسب محصول (کلزا ۱۰ تا ۱۲ درصد و گندم ۱۴ درصد بهترین شرایط رطوبت محصول برای برداشت با کمباین)</p> <p>- مبارزه با علف های هرز مزارع نخود با دستگاه کولتیواتور در راستای استفاده کمتر از سموم شیمیایی</p>
حفظ نباتات			<p>۱- سم پاشی باغات میوه با احتیاط و با مشورت کارشناسان صورت گیرد</p> <p>۲- کنترل علف های هرز باغات و مزارع بعد از بارش نزولات جوی</p> <p>۳- سم پاشی درختان گردو بلافاصله بعد از ریزش گلبرگها برای کنترل بیماری قارچی آنتراکنوز بعد از مساعد شدن شرایط آب و هوایی</p>

بولتن هواشناسی کشاورزی استان ایلام

تاریخ جلسه:

۱۴۰۴/۰۲/۰۷

صفحه ۳ از ۳

مرغداران با تغییرات هوای بهاری سیستم تهویه و اتوماسیون خود را تحت کنترل داشته باشند.

مرغداری